

服用前にこの説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

第3類医薬品

ビタミンEC主薬製剤 コイックスEC

天然型ビタミンE、ビタミンC配合

コイックスECは、末梢血行障害による肩や首すじのこりを改善し、体内の過酸化脂質を抑える重要な生理作用をもつビタミンEと、しみ・そばかすや日焼けなどの色素沈着を抑えたり、歯ぐきや鼻出血を予防し、ビタミンEの吸収を促進する作用のあるビタミンCに皮膚炎や口内炎などに関与するビタミンB₂を加えたのみやすい黄色の顆粒剤です。又、本品は天然型ビタミンEのなかでも特に生理活性の優れたd- α 型のビタミンEを使用しております。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。
出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	1 包	1日2～3回服用すること。 ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用すること。
11歳以上15歳未満	2/3 包	
7歳以上11歳未満	1/2 包	
3歳以上7歳未満	1/3 包	
3歳未満	服用しないこと。	

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

組成と作用 1日量3包中に次の成分を含む。

成 分	3包中	主 な 作 用
d- α -トコフェロール酢酸エステル (天然型ビタミンE)	300mg	末梢血行を促すと共に微小循環系の動態を改善する。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	2000mg	毛細血管の抵抗力を高める作用などがある。
リボフラビン酢酸エステル (ビタミンB ₂)	12mg	口角炎・口唇炎などを改善する。

添加物：カルメロースCa、メタケイ酸アルミン酸Mg、白糖、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料

- 本剤に配合されているリボフラビン酢酸エステルにより、尿が黄色になることがある。
- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがある。
医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせること。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。)
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先
田村薬品工業株式会社 お客様相談室
06-6203-5151
受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50