

第3類医薬品

ナボリン[®]S

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる] 次の人は服用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人



相談すること

① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

次の諸症状の緩和：眼精疲労、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、神経痛、手足のしびれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

用法・用量

成人（15歳以上）、1回1錠を1日3回食後に水またはお湯で服用してください。

成分

成人1日量3錠中に次の成分を含みます。
メコバラミン（活性型ビタミンB₁₂）1,500μg、葉酸5mg、酢酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）100mg、フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB₁誘導体）109.16mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）100mg

添加物として、タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、カルナウバロウ、ケイ酸Ca、酸化チタン、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、セラック、セルロース、二酸化ケイ素、白糖、ヒプロメロース、プルラン、ポビドン、マクロゴール、リン酸水素Caを含有

保管及び取扱い上の注意

① 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。（本剤は光に対して不安定です。）
② 小児の手の届かない所に保管してください。③ 他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
④ 容器内に乾燥剤が入っています。服用しないでください。⑤ 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。⑥ 使用期限内であっても容器のキャップを一度開けた後は、品質保持の点から6ヵ月以内を目安に使用してください。⑦ キャップの上ボタンを閉める時は、カチッと音がするまで押し込んでください。⑧ 錠数が残り少なくなると出にくい場合があります。キャップ本体を外して取り出してください。⑨ この説明書をよく読み、保管しておいてください。

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

関係部位	症状
皮膚	発疹、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢、軟便
- ④ 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ⑤ 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

使用期限

（西暦年・月）

製造番号

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

お問い合わせ先：エーザイ
☎ 0120-161-454