

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## ビタミンB1B6B12主薬製剤

眼精疲労・  
肩こり・腰痛に

# ユニベストBE

第3類医薬品

ユニベストBEは、ビタミンB1誘導体(フルスルチアミン塩酸塩)、活性型ビタミンB6、ビタミンB12を中心に、神経・筋肉系に作用して神経痛、腰痛、肩こり、眼精疲労の緩和に優れた効果を発揮する錠剤です。

パントテン酸カルシウムとガンマーオリザノールがビタミンB1、B6、B12の作用をサポートします。

肩こりの要因のひとつ、血行不良に対し、天然型ビタミンEとニコチン酸の2成分が血行をよくし、疲労物質を除去することで、筋肉の痛みを改善します。


### ⚠ 使用上の注意

#### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、腹部膨満感、胃部不快感
精神神経系	頭痛
循 環 器	動悸

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

軟便、下痢、便秘、顔面・皮膚の紅潮

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効 能

○次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

○次の場合のビタミンB1B6B12の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 用法・用量

次の量を、食後すぐに、水又はお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	2～3錠	1日1回
15才未満	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

## 成分・分量

3錠中

成分名	分量	作用
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	109.16mg	吸収のよいビタミンB <sub>1</sub> で、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労などの症状を改善します。
ピリドキサル リン酸エステル水和物 (活性型ビタミンB <sub>6</sub> )	60mg	体内で利用されやすいビタミンB <sub>6</sub> で、神経の機能を正常に保ちます。
シアノコバラミン (ビタミンB <sub>12</sub> )	1500μg	末梢神経の機能を正常に保つ作用があります。
コハク酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	末梢血管を拡張して血行をよくし、肩こり、手足のしびれの緩和に効果があります。
ニコチン酸	30mg	末梢部の血行をよくし、肩こり、手足のしびれの緩和に効果があります。
パントテン酸カルシウム	30mg	エネルギー産生に必要なビタミンです。
ガンマーオリザノール	10mg	自律神経の乱れをコントロールします。

添加物:乳酸Ca水和物、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、無水ケイ酸、乳糖水和物、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、セラック、カルナウバロウ、三二酸化鉄

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないでください。
- (6)ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。これをビンに出し入れしますと異物混入の原因になることがあります。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：058-278-3933  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の  
お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鷗1丁目139番地