この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、 必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンB1B6B12主薬製剤

第3類医薬品

つらい肩・首すじの こり、腰の痛みに

アクティビタミンGXゴールド

- アクティビタミンGXゴールドは、吸収の良いビタミンB1誘導体(フルスルチアミン塩酸塩)、体内で利用されやすい活性型ビタミンB6(ピリドキサールリン酸エステル水和物)、末梢神経の修復を促す活性型ビタミンB12(メコバラミン)、さらには自律神経の働きを助けるガンマーオリザノールを配合することで、肩・首すじのこり、腰痛などのつらい症状に優れた効果を発揮します。
- 天然型ビタミンEとニコチン酸アミドが凝り固まった肩や腰の血行を促進します。
- パントテン酸カルシウムがエネルギー代謝に関わり、肉体疲労時の栄養補給に働きます。

↑ 使用上の注意

△ 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、腹部膨満感、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

軟便、下痢、便秘

- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。 出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する こと

効 能

○次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手 足のしびれ、眼精疲労

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

○次の場合のビタミンB1B6B12の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後 の体力低下時

用法•用量

次の量を、食後すぐに、水又はお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1錠	1⊟3回 ≆いこと

< **用法・用量に関連する注意** > 用法・用量を厳守してください。

成分•分量

3錠中

成分名	分量	作用
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB1誘導体)	109.16mg	神経や筋肉の機能を正常に保ち、眼精疲労、肩こりを緩和します。
メコバラミン (活性型ビタミンB12)	1500µg	神経の修復を促すことで、神経痛や手足のしびれを緩和します。
ピリドキサールリン酸 エステル水和物 (活性型ビタミンB6)	60mg	代謝や神経機能に関わり、疲れや神 経痛を緩和します。
ニコチン酸アミド (ビタミンB3)	60mg	代謝に関わるほか、血行を促進。眼精 疲労や肩こりを緩和します。
コハク酸 <i>d-α-</i> トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	血行を促進し、肩こり、手足のしびれ を緩和します。
ガンマーオリザノール	10mg	自律神経の働きを助け、肩こり、腰痛 を緩和します。
パントテン酸カルシウム	30mg	代謝に関わり、肉体疲労時の栄養補給に働きます。

添加物:乳酸Ca水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、部分アルファー化デンプン、無水ケイ酸、乳糖水和物、セルロース、ヒプロメロース、タルク、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、酸化チタン、大豆レシチン、リボフラビン、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、 誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないでください。
- (6)ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。これをビンに出し入れしますと異物混入の原因になることがあります。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めの お店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室 電話:058-278-3933 受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構 ■ 0120-149-931(フリーダイヤル)

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶉1丁月139番地