

- 服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
- 使用期限(パッケージ側面及びピンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

小林製薬の 医薬品

コバラミン EX

販売名: コバラミンEX

ビタミンB1B6B12主薬製剤 第3類医薬品

特
徴

1. ビタミンB1誘導体、B6、B12、ガンマーオリザノールを配合。筋肉疲労を回復し、末梢神経にはたらくことで、目の疲れ、肩こり、腰の痛みなどのツライ症状にすぐれた効果をあらわします
2. 補酵素となってエネルギーの産生に作用するパントテン酸カルシウム、体の末端の血液循環を改善するビタミンEを配合しています

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢、便秘
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労
「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること」
- 次の場合のビタミンB1B6B12の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量 次の量を食後に水又はお湯でかまずに服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2～3錠	1回
15才未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること

成分・分量 3錠中

成分	分量	はたらき
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体) (フルスルチアミンとして100mg)	109.16 mg	神経痛や筋肉痛などの症状緩和 炭水化物のエネルギー産生に役立つ
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	100 mg	神経の機能維持
シアノコバラミン(ビタミンB12)	1,500 µg	神経の機能維持
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) (dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)	103.58 mg	末梢の血液循環を改善する
パントテン酸カルシウム	30 mg	補酵素となってエネルギーの産生に作用する
ガンマーオリザノール	10 mg	神経や筋肉の機能維持に役立つビタミンB1、 B6、B12の働きを助ける

添加物として、乳糖、ゼラチン、セルロース、無水ケイ酸、カルメロースCa、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム、炭酸Ca、白糖、酸化チタン、リボフラビン、カルナウバロウ、乳酸Caを含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) ピンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること
- (6) 乾燥剤は服用しないこと

製品のお問合せは、下記のお客室相談室又はお申し込みの電話番号に
お願いいたします

製品のご質問・ ご相談は	0120-63-9876 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日除く)
オンラインショップ	www2.kobayashi.co.jp

発売元
 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製造販売元
米田薬品工業株式会社
〒635-0123 奈良県高市郡高取町市尾986