

この説明文書はお薬とともに保管してください。また服用時によくお読みください。

ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤

アリナエコーEXP 第3類医薬品

[特 徴]

ビタミンB₁：誘導体フルスルチアミン、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂を配合し、「目の疲れ」「肩こり」「腰の痛み」などの症状にすぐれた効果をあらわします。また、パントテン酸カルシウムは補酵素(コエンザイムA)となってエネルギーの产生に重要な働きをし、ビタミンB₆は体のすみすみの血液循環を改善します。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること　軟便、下痢、便秘

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[成分・分量] 3錠(1日最大服用量)中

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB₁:誘導体) 109.16mg(フルスルチアミンとして100mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 100mg、シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) 1.500μg、トコフェロールコハク酸エチルカルシウム(ビタミンD) 103.58mg(d₃-トコフェロールコハク酸エチルとして100mg)、パントテン酸カルシウム 30mg、ガムマーオリザノール 10mg、添加物として乳酸Ca水和物、無水ケイ酸、ヒドロキシプロビルセルロース、セラセフェート、セルロース、パレイショデンプン、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ヒプロロース、白糸、アラビゴム末、ポリオキシエチレンポリオキシブローピングリコール、タルク、醸化チタン、リポラビリジン酸エチルNa、カルナウバロウを含む。

[効能・効果] 1. 次の諸症状の緩和: 眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神經痛、手足のしびれ「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

2. 次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給: 内体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

[用法・用量] 次の量を食後すぐに水又はお湯で、服用すること。

[用法・用量に関する注意]

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

2. 用法・用量を厳守してください。

[保管及び取扱上の注意]

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)4. ピンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するためのものですので、開封後に捨ててください。(本剤は糖衣錠のため、落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意ください。)5. 容器内の乾燥剤は服用しないでください。6. 服用のつどピッキンのキャップをしっかりと閉めてください。(吸湿し品質が変わることがあります。)7. 錠剤は濡れた手で扱わないでください。(糖衣錠がはげたり変色の原因となります。)8. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。9. 箱の「開封年月日」記入欄に、ピッキンを開封した日付を記入してください。10. 開封後は、品質を保つ意味で開封日から6ヶ月以内の服用を目安にしてください。

製造販売元 **寧葉化学工業株式会社**

〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2番25号

SA3815180606

△ 使用上の注意

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2~3錠	1回
11歳以上15歳未満	1錠	
11歳未満		服用しないこと