

この説明文書はお薬とともに保管してください。また服用時によくお読みください。

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>製剤

**ビタエビシンEXP**

第3類医薬品

**【特長】**

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>は神経や筋肉に働きかけて糖分の代謝を促進し、疲労を回復します。またガンマ-オリザノールを配合することにより自律神経の働きを助け眼精疲労や、肩こり、腰痛などの関節痛、神経痛の改善に役立ちます。ビタミンEは血流を良くして手足のしびれや肩こりに効果があります。パントテン酸カルシウムは脂肪・糖分の代謝を促進します。

**⚠ 使用上の注意**



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 (1)医師の治療を受けている人  
 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 軟便、下痢、便秘
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【成分・分量】 3錠(1日最大服用量)中**

成 分	含 量
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体) (フルスルチアミンとして)	109.16mg (100mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	100mg
シアノコバラミン(ビタミンB <sub>12</sub> )	1,500μg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) (dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして)	103.58mg (100mg)
パントテン酸カルシウム	30mg
ガンマ-オリザノール	10mg

添加物として乳酸Ca水和物、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セラセフェート、セルロース、バレイショデンプン、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、アラビアゴム末、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、酸化チタン、リボフラビンリン酸エステルNa、カルナウバロウを含む。

## 【効能・効果】

1. 次の諸症状の緩和:眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
2. 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>B<sub>6</sub>B<sub>12</sub>の補給:肉体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

## 【用法・用量】

次の量を食後すぐに水又はお湯で、服用すること。


年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2~3錠	1回
11歳以上15歳未満	1~2錠	
11歳未満	服用しないこと	

## 【用法・用量に関連する注意】

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2. 用法・用量を厳守してください。

## 【保管及び取扱上の注意】

1. 直接日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. **ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するためのものですので、開封後に捨ててください。**  
(本錠は糖衣錠のため、落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意ください。)
5. ビンの中の包装紙に包まれた平型錠は乾燥剤です。服用しないでください。
6. 服用のつどビンのキャップをしっかりと閉めてください。(吸湿し品質が変わることがあります。)
7. 錠剤は濡れた手で扱わないでください。(糖衣錠がはげたり変色の原因となります。)
8. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
9. 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
10. 開封後は、品質を保つ意味で開封日から6ヵ月以内の服用を目安にしてください。



**副作用被害救済制度の問合せ先**  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 120-149-931, 03-3506-9411

お問い合わせはお買い求めの薬局・薬店または下記にお願いします。  
**寧薬化学工業株式会社** 〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2-25  
電話:0745-22-4151 9:00~16:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **neac** 寧薬化学工業株式会社  
〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2番25号

BR4345121128

第3類医薬品 大容量 480錠

目の疲れ、肩こり、腰の痛みに

ビタエビソ  
EXP

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>・E・PanCa・γ-ORZ 配合

ビンの中の詰物は錠剤の  
破損防止用です  
開栓時に捨ててください

第3類医薬品

大容量  
480錠

ひざ・肩・腰などの

関節  
痛  
神経 筋肉

ビタエビソ  
EXP

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>・E・パントテン酸Ca・  
γ-オリザノール配合

目の疲れ、

肩こり、

腰の痛みに

ビタエビソ 大容量  
EXP 480錠

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>・E・  
パントテン酸Ca・  
γ-オリザノール配合

第3類医薬品

使用期限

製造番号

開封年月日  
年 月 日

販売名:ビタエビソEXP 第3類医薬品

【効能・効果】

1. 次の諸症状の緩和・軽減効果、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ(ただし、これらの症状については、1ヶ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。)  
2. 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>の補給(肉体的疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期)

【用法・用量】

次の量を水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2~3錠	1回
11歳以上15歳未満	1~2錠	1回
11歳未満	服用しないこと	

【成分・分量】

3錠(1日最大服用量)中  
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体).....109.16mg  
(フルスルチアミンとして100mg)  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>).....100mg  
シアノコバラミン(ビタミンB<sub>12</sub>).....1.500μg  
トコフェロール酢酸エステルカルシウム(ビタミンE).....103.58mg  
(α-トコフェロール酢酸エステルとして100mg)  
パントテン酸カルシウム.....30mg  
γ-オリザノール.....10mg  
添加物として乳酸Ca水和物、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セラセエート、セルロース、ポリビニルピロリドン、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ヒプロシロース、白糖、アラビアゴム末、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、酸化チタン、リポフラスリン酢酸エステルNa、カルナウバワックスを含む。

【注 意】

1. 服用が適でない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
2. 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。  
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。

製造販売元 摩薬化学工業株式会社  
奈良県大和高田市旭町2-25

お問い合わせ 摩薬化学工業株式会社  
相談窓口 ☎ 0745-22-4151  
受付時間 9時~16時(土・日・祝日を除く)

AS4162180912

開封口

ひざ・肩・腰などの  
関節痛 神経痛 筋肉痛 に

6つの有効成分配合

ビタミンB<sub>1</sub>

フルスルチアミン  
塩酸塩

ビタミンE

トコフェロール酢酸  
エステルカルシウム

ビタミンB<sub>6</sub>

ピリドキシン  
塩酸塩

PanCa

パントテン酸  
カルシウム

ビタミンB<sub>12</sub>

シアノコバラミン

γ-ORZ

ガンマオリザノール

副作用検査数済制度 ☎0120-149-931



紙: 箱

ラ: 詰め物