C509

販売名：トレビタンEXP　第3類医薬品

〔保管及び取り扱い上の注意〕

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2.小児の手の届かない所に保管してください。
3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
4.ビンの中の詰め物は、開封後に捨ててください。詰め物を捨てたのちは、落下等の衝撃で錠剤破損(糖衣層の欠け)が生じることがありますので、取り扱いには注意してください。(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです)
5.ビンの中の包装紙に包まれた平型錠は乾燥剤です。服用しないでください。
6.服用の都度ビンのキャップをしっかり閉めてください。(吸湿すると品質が変わることがあります)
7.錠剤は濡れた手で扱わないでください。(糖衣層がはげたり変色の原因となります)
8.使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
9.開封後は、品質を保つ意味で開封日から6ヵ月以内の服用を目安にしてください。

発売元　株式会社クルード
大阪府大阪市西区北堀江1-19-1

お問い合わせ
相談窓口☎050-5212-4895
受付時間（平日：月・水・木・金）
AM9:30～PM1:00／PM2:00～PM6:00

製造販売元　寧薬化学工業株式会社
奈良県大和高田市旭南町2番25号

開封年月日

年　月　日

〔成分・分量〕3錠(1日最大服用量)中

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)‥109.16mg
(フルスルチアミンとして100mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100mg
シアノコバラミン(ビタミンB12)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1,500μg
トコフェロールコハク酸ジエステルカルシウム(ビタミンE)‥103.58mg
(dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)
パントテン酸カルシウム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30mg
ガンマ-オリザノール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10mg

添加物として、乳酸Ca水和物、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セラセフェート、セルロース、バレイショデンプン、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、アラビアゴム末、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、酸化チタン、リボフラビンリン酸エステルNa、カルナウバロウを含有する。

〔効能・効果〕

1. 次の諸症状の緩和:眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
2. 次の場合のビタミンB1 B6 B12 の補給:肉体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

〔用法・用量〕

次の量を服用してください。

年　齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2～3錠	1回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
11歳未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

1.小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2.用法・用量を厳守してください。

副作用被害救済制度　☎0120-149-931

AS4102211125

ひざ・腰・肩などの
関節痛・神経痛に
関節の友
トレビタンEXP
第3類医薬品　90錠

ひざ・腰・肩などの
関節
神経
痛

ビタミンB1 B6 B12 主薬製剤

B1 B6 B12 E

関節の友
トレビタンEXP
第3類医薬品　90錠

使用期限　製造番号

紙:箱　プラ:詰め物

4 589840 183099

服用前に、この説明文をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
軟便、下痢、便秘

4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

5.服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。