



ここからハサミでお切りください。-----

シビリトル

60 TABLETS

Fursultiamine Hydrochloride 109.16mg

Tocopherol Calcium Succinate 103.58mg

Pyridoxine Hydrochloride 100mg

Calcium Pantothenate 30mg

Cyanocobalamin 1,500 μ g

γ -Oryzanol 10mg

第3類医薬品

コースシックス シビリトル

••6
Cause Six



NR



ここからハサミでお切りください。-----

開封後は、湿らないようにチャックを合わせて端からしっかりと押さえてください。

ビタミンB1B6B12 主薬製剤 販売名: コーズシックス シビリトル 60錠

第3類医薬品

服用の際はこの説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐・口内炎・胃部不快感

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

3. 服用後、次の症状があらわれるものので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。軟便、下痢、便秘

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】●次の諸症状の緩和:神経痛・筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。●次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1~2錠	1回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

【用法・用量】用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量(2錠) 中

成 分	分 量	成 分	分 量
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB ₁ 誘導体) [フルスルチアミンとして]	109.16mg (100mg)	トコフェロールコハク酸エチルカルシウム(ビタミンD) [トコフェロールコハク酸エチルとして]	103.58mg (100mg)
ビリキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg	パントテン酸カルシウム	30mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	1,500 μ g	ガムマーオリザーノール	10mg

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、乳糖水和物、パレシヨデンブン、乳酸Ca水和物、ステアリン酸Mg、酸化チタン、タルク、ヒドロメロース、マクロゴール、リボフラビンリン酸エチルNaを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4) 服用の都度チャックをしっかり閉めてください。(5) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。(6) 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

発 売 元: 株式会社NR 本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

東京都中央区日本橋小伝馬町4-3 製品のお問合せ先: NR SHOP ☎03-6667-0442

フジスター小伝馬ビル7F お客様相談窓口 受付時間 10:30~17:30(土、日、祝日を除く)


製造販売元: 寧薬化学工業株式会社 奈良県大和高田市旭南町2番25号 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

製造番号

YM4254220930 MADE IN JAPAN





× ここからハサミでお切りください。-----
開封後は、湿らないようにチャックを合わせて端からしっかりと押されてください。

ビタミンB1 B6 B12 主葉製剤 販売名: コーズシックス シビリトル 60錠 第3類医薬品

【服用の際はこの説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。】

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐・口内炎・胃部不快感

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。軟便、下痢、便秘
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 服用後、生理が予定より早くたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】●次の諸症状の緩和・神経痛、筋肉痛、関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目の痛み・目の奥の痛み)【ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。】●次の場合のビタミンB1 B6 B12の補給: 体肉疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1~2錠	1回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満		服用しないでください

【用法・用量】次の量を服用してください。
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量(2錠) 中

成 分	分 量	成 分	分 量
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB ₁ 誘導体) [フルスルチアミンとして]	109.16mg (100mg)	トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) [トコフェロールコハク酸エステルとして]	103.58mg (100mg)
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg	バントテン酸カルシウム	30mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	1,500μg	ガンマーオリザノール	10mg

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、乳糖水和物、パレイショデンプン、乳酸Ca水和物、ステアリン酸Mg、酸化チタン、タルク、ヒプロロース、リオラビリエン酸エステルNaを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4)服用の都度チャックをしっかり閉めてください。(5)使用期限を過ぎたものは服用しないでください。(6)袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

発 売 元 : 株式会社NR
東京都中央区日本橋小伝馬町4-3
フジスター小伝馬ビル7F
製造販売元 : 寧業化学工業株式会社
奈良県大和高田市旭南町2番25号

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。
製品のお問合せ先 [NR SHOP ☎ 03-6667-0442
お客様相談窓口] 受付時間 10:30~17:30(土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

製造番号

YM4255221111 MADE IN JAPAN

