

ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤



BG錠

● シアノコバラミン ● パントテン酸カルシウム ● トコフェロール
● リドキシン ● ガンマ-オリザノール

リョウシン

手足のしびれ 神経痛 関節痛
ひざ・腰・肩などの痛み

飲んで効く医薬品

31日分 62錠 第3類医薬品

▲ここからお切りください。手で簡単に切れます。

▼ここからお切りください。手で簡単に切れます。

湿気を避けるため、開封後はチャックをしっかりと閉めください。

服用の際はこの説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤
販売名：リョウシンBG錠

第3類医薬品

【成分・分量】2錠(1日最大服用量)中

シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	1,500μg
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB ₆ 誘導体) (フルスルチアミンとして)	109.16mg (100mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) (トコフェロールコハク酸エステルとして)	103.58mg (100mg)
パントテン酸カルシウム	30mg
ガンマ-オリザノール	10mg

添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、乳糖水和物、パレイショデンプン、乳酸Ca水和物、ステアリン酸Mg、酸化チタン、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール、リボフラビンリン酸エステルNaを含有する。

【効能・効果】

次の諸症状の緩和：手足のしびれ、神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】次の量を水またはぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～2錠	1回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2)定められた用法・用量を厳守してください。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4)服用の都度チャックをしっかりと閉じてください。(吸湿し品質が変わることがあります。)(5)使用期限を過ぎたものは服用しないでください。(6)袋の中に乾燥剤が入っています。食べないでください。(7)開封後は、品質を保つ意味で開封日から6カ月以内の服用を目安にしてください。

△使用上の注意

■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

- 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

お問い合わせ 株式会社富山常備薬

☎0120-309-093

受付時間：9時～18時(年中無休)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

〈製造販売元〉

寧薬化学工業株式会社
奈良県大和高田市旭南町2番25号

〈発売元〉

株式会社富山常備薬
富山県富山市丸の内1-8-17

使用期限

製造番号



4 580544 061072



MADE IN JAPAN

OS4326250513