

 東洋新薬グループ
FORMAL KLEIN

第3類医薬品

ビタミンB1・B6・B12製剤

リフレアイ

つらい眼精疲労に

肩こり・腰痛にも

販売名：リフレアイ
神経痛、筋肉痛、眼精疲労
関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）
手足のしびれ
30日分（90錠）



販売名:リフレアイ

第3類医薬品

効能・効果

- 次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	2~3錠	1日1回

〈用法・用量に関する注意〉

用法・用量を厳守してください。

成分・分量 1日量(3錠中)

トコフェロールコハク酸エステルカルシウム···103.58mg
(トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)
フルスルチアミン(ビタミンB₁誘導体)として100mg
(フルスルチアミン塩酸塩···109.16mg)
ピリドキシン塩酸塩···100mg
シアノコバラミン···1,500μg
パンテン酸カルシウム···30mg
ニコチン酸アミド···60mg
ガムマーオリザノール···10mg
添加物として、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、白糖、酸化チタン、アラビアゴム末、ポビドン、リボフラビン、カルナウバロウを含む。

〈注意〉●服用に関しては、この面をよく読んでください。●直射日光の当たらない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)●容器のチャックのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質する恐れがありますので、服用後は、そのつど必ずチャックをしっかり閉めてください。●ぬれた手で触れないでください。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。●使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より、6ヶ月以内に服用してください。●袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

発売元 株式会社フォーマルクライ
福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1
TEL 0120-043-469

使用期限

製造番号

ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器
症 状	発疹、発赤、かゆみ	吐き気、嘔吐、口内炎

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 服用後、生理が予定より早くたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



本品についてのお問い合わせは

至誠堂製薬株式会社 お客様相談室 受付時間 10:30~15:00
TEL 0745(62)5555 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931