



ここからお切り下さい。

チャック

開封後チャックを閉じて保管して下さい。

関節  
神経

痛

第3類医薬品

# アユミンS

- ・ビリビリする手足のしびれを緩和
- ・血行を促進しつらい症状に効果を発揮
- ・ピキッとする関節の痛みを緩和

90錠

1日1回:2-3錠

● ● ここからお切り下さい。

開封後チャックを閉じて保管して下さい。

【販売名】アユミン S

第3類医薬品

ビタミンB<sub>1</sub>、B<sub>6</sub>、B<sub>12</sub>主薬製剤



相談すること

⚠ 使用上の注意

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
便秘、軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**【効能・効果】**次の諸症状の緩和：神經痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB<sub>1</sub>、B<sub>6</sub>、B<sub>12</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

**【用法・用量】**15歳以上、1回2~3錠を1日1回、食後すぐに水またはお湯で、かまざに服用して下さい。  
<用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守して下さい。

**【成分・分量】**1日量（3錠中）

フルスルチアミン（ビタミンB<sub>1</sub>）として100mg [フルスルチアミン塩酸塩 109.16mg]、トコフェロールコハク酸エステルとして100mg [トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 103.58mg]、ビリドキシン塩酸塩（ビタミンB<sub>6</sub>）100mg、ニコチニ酸アミド60mg、ガムマオリザノール10mg、バントテン酸カルシウム30mg、シアノコバラミン（ビタミンB<sub>12</sub>）1,500μg、添加物として、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、白糖、酸化チタン、アラビアゴム末、ポビドン、リボフラビン、カルナウバロウを含む。

**【保存及び取り扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります) (4) アルミ袋の閉め方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質する恐れがありますので、服用後はそのつど必ずチャックをしっかりと閉めて下さい。(5) ぬれた手で触らないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内に服用して下さい。

発 売 元：株式会社アップセール  
東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

製造販売元：至誠堂製薬株式会社  
奈良県御所市茅原 220-1

副作用被害救済制度：☎ 0120-149-931 版No.6

使用期限 製造番号

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い  
申し上げます。

## 健康ドラッグストア

お問い合わせ先：健康ドラッグストア  
フリーダイヤル 0120-813-318  
(受付時間/平日 10:00-17:00 土日祝日定休日)



4 582639 320019