

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。




# アリナパロミンゴールド<sup>®</sup>

第3類医薬品

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub> 製剤

## 特徴

- 肉体疲労時のビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>の補給に  
肉体疲労時や病中病後には、ビタミンの消耗が著しく、ビタミン不足になります。そのビタミンの中でもビタミンB<sub>1</sub>は体内のエネルギーの発生に特に必要なビタミンです。アリナパロミンゴールドは、このビタミンB<sub>1</sub>を効率よく体内に補給するように吸収の良いフルスルチアミンと、それに協力的に働くビタミンB<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>をバランスよく配合していますので、すぐれた効果を表わします。



## △ 使用上の注意

### 相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢
- 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

裏面もお読みください

## 効能・効果

### ●次の諸症状の緩和

神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

### ●次の場合のビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 用法・用量

年齢	1回量
15歳以上	2錠
7歳以上15歳未満	1錠
7歳未満は服用しないこと	



いずれも1日1~2回朝夕に服用する。

## 用法・用量に関する注意

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。


## 成分・分量 1日量(4錠中)

成 分	分 量
フルスルチアミン塩酸塩(V.B <sub>1</sub> 誘導体)	75mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B <sub>6</sub> )	50mg
シアノコバラミン(V.B <sub>12</sub> )	1,000μg

添加物としてカルメロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、パレイショデンプン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、沈降炭酸カルシウム、ゼラチン、アラビアゴム末、酸化チタン、精製白糖、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、パラフィン、着色料黄色4号(ターラジン)を含む。

## 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になつたり品質が変わる。)
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。



## 製造販売元

**WAKIワキ製薬株式会社**  
〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898  
URL:<http://www.a-kusuri.co.jp/>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)