

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

アリナパロミンゴールド

第3類医薬品

ビタミンB₁・B₆・B₁₂ 製剤

アリナパロミンゴールドのはたらき

手足のしびれ

ビタミンB₁₂は、正常な神経細胞を維持し、脳からの指令を手足などの末端に伝える神経機能を正常に保つ働きがあります。また、傷ついた末端の神経を修復するのにも役立ちます。

関節痛・神経痛

ビタミンB₁は、神経機能がうまく働かなくなると現れる神経痛などの症状を緩和します。

フルスルチアミン（ビタミンB₁誘導体）は腸管からの吸収がよく、神経や筋肉などに届きやすい為、効率よく働き、さらに、フルスルチアミンを補助するビタミンB₆を配合することで、つらい関節痛にも優れた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

●次の諸症状の緩和

神経痛 筋肉痛、関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）
【ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。】

●次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年齢	1回量
15歳以上	2錠
7歳以上15歳未満	1錠
7歳未満	は服用しないこと

いずれも1日1～2回朝夕に服用する。



用法・用量に関する注意

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量


1日量（4錠中）

成 分	分 量
フルスルチアミン塩酸塩（V.B ₁ 誘導体）	75mg
ピリドキシン塩酸塩（V.B ₆ ）	50mg
シアノコバラミン（V.B ₁₂ ）	1,000μg

添加物としてカルメロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、パレイショデンプン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、沈降炭酸カルシウム、ゼラチン、アラビアゴム末、酸化チタン、精製白糖、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、パラフィン、着色料黄色4号（タートラジン）を含む。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



発 売 元 新光通販株式会社
東京都中央区東日本橋2-2-6

製造販売元 ワキ製薬株式会社
奈良県北葛城郡広陵町南郷898

ご注文専用 TEL : 0570-04-2222 (朝8時～夜10時 年中無休)
FAX : 03-3863-8839 (24時間受付 年中無休)

お問合せ専用 TEL : 03-3851-6868 (朝9時30分～夜6時 土日祝日休み)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 : 0120-149-931 (フリーダイヤル)