

ここからお切りください。-----
開封後は、湿らないようにチャックを合わせて端からしっかり押さえてください。



いぶきじょう
【販売名】息吹錠 <ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤>

第3類医薬品

服用に際して、袋の表示を必ず読むこと

内容量120錠

 **相談すること**

 **使用上の注意**

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢

3.1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

●次の諸症状の緩和
神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

●次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時


用法・用量

年 齢	1回量
15歳以上	2錠
7歳以上15歳未満	1錠
7歳未満は服用しないこと	

いずれも1日1～2回朝夕に服用する。

【お問い合わせ・発売元】

新甲賀漢方株式会社
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

 0120-187-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【製造販売元】

フキ製薬株式会社
奈良県北葛城郡広陵町南郷898

用法・用量に関連する注意

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量 1日量(4錠中)

成 分	分 量
フルスルチアミン塩酸塩(V.B ₁ 誘導体)	75mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B ₆)	50mg
シアノコバラミン(V.B ₁₂)	1,000μg

添加物としてカルメロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、バレイシヨデンブ、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、沈降炭酸カルシウム、ゼラチン、アラビアゴム末、酸化チタン、精製白糖、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、パラフィン、着色料黄色4号(タートラジン)を含む。


【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

製造番号

使用期限



副作用被害救済制度
 0120-149-931

