

← 切口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

チャック

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。

コングルコン 1

第3類医薬品

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

使用
期限
製造
番号

【内容量】30錠

【成分・分量】1日量(1錠)中

成分	分量
チアミン硝酸物(ビタミンB1)	10mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	100mg
シアノコバラミン(ビタミンB12)	1.5mg

添加物：軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、タルク、酸化チタン、黄色三酸化鉄

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)
- 湿気等の影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずチャックをしっかり閉めてください。
- ぬれた手で触れないでください。水分が錠剤にくくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。
- 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 使用期限内であっても、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

【効能・効果】

●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)
[ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。]

●次の場合のビタミンB1B6B12の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	1錠	1日1回
15歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

用法・用量を守ってください。

発売元

株式会社東京ディベロ
東京都中央区日本橋本石町4-2-16

製造販売元

シオノケミカル株式会社
東京都中央区八重洲2丁目10番10号

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931



お問い合わせ先
株式会社東京ディベロ
電話 0120-107-111
受付時間 9:00～18:00
(日祝、年末年始を除く)