

〔使用上の注意〕

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1回1瓶(100mL)1日1回服用してください。

- 15歳未満は服用しないでください。
- 用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

100mL

ガラス:瓶

金属:キャップ

4NA2

# 牛黄

インヨウカク  
ローヤルゼリー  
コンドロイチン

# 人參

生薬配合

肉体疲労・  
病中病後  
などの場合の  
栄養補給

第2類医薬品

スリービタミンX 100mL

〔成分・分量〕1日量1瓶(100mL)中 登録品目番号24-411

ローヤルゼリーチンキ200mg(ローヤルゼリー200mgに相当)、ニンジンエキス54.1mg(ニンジン600mgに相当)、ゴオウ浸出液20mg(ゴオウ2mgに相当)、イカリソウエキス20mg(インヨウカク200mgに相当)、チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)3mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム300mg、カルニチン塩化物100mg

(アルコール0.2mL以下)

添加物として、白糖、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、カラメル、安息香酸Na、パラベン、ピロリン酸Na、ポリリン酸Na、メタリン酸Na、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン、バニリン、トメントール、香料、pH調整剤を含有する。

- 本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 4.使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社廣 貫 堂

富山市梅沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口)電話076-424-2259

¥500+税

使用期限

製造記号

