

販売名 イキビタンSPU3000

〔使用上の注意〕

〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)

1回1瓶(100mL)1日1回服用してください。

- 15歳未満は服用しないでください。
- 用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

94A2

ガラス:瓶
金属:キャップ

ロ-ヤルゼリー

コンドロイチン

牛黄

100mL
カルシデオキシコール酸
滋養強壮・栄養補給

タウリン配合

3000mg
第2類医薬品



Suppli

株式会社 サプリ

登録品目番号24-525

〔成分・分量〕1日量1瓶(100mL)中

インヨウカク液エキス0.15mL(インヨウカク150mgに相当)、ゴオウ浸出液5mg(ゴオウ0.5mgに相当)、ロ-ヤルゼリーチンキ50mg(ロ-ヤルゼリー50mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム120mg、ウルンデオキシコール酸10mg

(アルコール0.2mL以下)

添加物として白糖、果糖ブドウ糖液糖、シクロデキストリン、カラメル、アセスルファムK、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、pH調整剤、クエン酸Na水和物、エタノール、グリセリン、バニリン、香料を含有する。

- 本剤に含まれるビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社廣貴堂
富山市梅沢町2丁目9-1
(お客様相談窓口) 電話076-424-2259



使用期限

製造記号