

## 〔使用上の注意〕

## 〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

## 〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1回1瓶(100mL)  
1日1回服用してください。

- 15歳未満は服用しないでください。
- 用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

100mL

ガラス:瓶

金属:キャップ

06A2

# 牛黄人参

インヨウカク  
タイソウ  
ローヤルゼリー  
コンドロイチン

生薬配合

肉体疲労・  
病中病後  
などの場合の  
栄養補給

第2類医薬品

スリービタXX 100mL

〔成分・分量〕1日量1瓶(100mL)中 登録品目番号24-544

インヨウカク軟エキス10mg(インヨウカク100mgに相当)、タイソウエキス30mg(タイソウ75mgに相当)、ニンジンエキス54.1mg(ニンジン600mgに相当)、ゴオウチンキ0.05mL(ゴオウ0.5mgに相当)、ローヤルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム3mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、カルニチン塩化物60mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム120mg

添加物として、白糖、果糖ブドウ糖液糖、カラメル、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、クエン酸Na水和物、pH調整剤、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、トメントール、香料を含有する。

- 本剤に含まれるビタミンB<sub>2</sub>により、尿が黄色になることがあります。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりありません。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 4.使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

550円  
(税抜価格500円)

製造販売元 株式会社廣貫堂  
富山市梅沢町2丁目9-1  
(お客様相談窓口)電話076-424-2259

使用期限

製造記号

