

滋養強壯 30mL
発熱性消耗性疾患時の栄養補給に

クレビタン

内服液A

第3類医薬品



製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地
お客様相談室 電話：0120-584-419

〔使用上の注意〕 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹／消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔用法・用量〕

成人（15才以上）1日1回1本（30mL）を服用してください。○用法・用量を厳守してください。○小児には服用させないでください。○本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈殿を生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

〔効 能〕

○滋養強壯 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔成分・分量〕 30mL中

ニンジン乾燥エキス42mg、ゴオウチンキ0.2mL、ローヤルゼリー50mg、チアミン衍化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム6mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド30mg、タウリン300mg、無水カフェイン50mg（アルコール0.5mL以下）
添加物：アルコール、白糖、D-ソルビトール、メタリン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、バラベン、香料

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。(4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

ガラス：瓶

金属：キャップ

1 品目番号 293-101

使用
期限

製造
番号