

〔用法・用量〕 成人(15才以上)  
1回1瓶(30mL)を1日3回服用  
してください。○用法・用量を厳  
守してください。○小児には服用  
させないでください。

〔成分・分量〕 30mL中  
カンゾウエキス…300mg、ショ  
ウキョウ流エキス…0.33mL、麦  
門冬流エキス…0.1mL、ピリド  
キシン塩酸塩…10mg、ニコチ  
ン酸アミド…10mg、パンテノ  
ール…10mg、タウリン…300mg  
(アルコール0.3mL以下)  
添加物:アルコール、白糖、クエン  
酸Na水和物、クエン酸水和物、  
安息香酸Na、パラベン、香料、ブ  
ロピレングリコール、バニリン、ミ  
ツロウ、l-メントール

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

かぜなどで熱が出て  
体がだるい時、食欲のない時の

栄養補給・  
滋養強壮に

カンゾウエキス・ショウキョウ流エキス  
麦門冬流エキス 配合

ヒストミンプラス液S

〔効能〕

- 病中病後・発熱性消耗性疾患・  
肉体疲労・胃腸障害・栄養障害  
などの場合の栄養補給
- 滋養強壮 ○虚弱体質

第2類医薬品

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鷺1丁目139番地

お客様相談室 電話:0120-584-419

〔使用上の注意〕 してはいけないこと(守らないと  
現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくな  
る) 長期連用しないこと

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又  
は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受  
けている人。(2)高齢者。(3)むくみのある人。(4)高血  
圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.服用後、  
次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が  
あるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:  
発疹/消化器:胃部不快感 まれに下記の重篤な症  
状が起こることがある。その場合は直ちに医師の  
診療を受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー:  
手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加  
えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。  
3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、  
このような症状の持続又は増強が見られた場合に  
は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談すること 下痢 4. 5~6日  
間服用しても症状がよくなる場合は服用を中  
止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談すること

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ  
さい。(2)小児の手の届かない所に保管してくだ  
さい。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。