

⚠ 使用上の注意

■相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚：発疹／消化器：胸やけ、吐き気

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢

3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

○用法・用量を厳守してください。

○小児には服用させないでください。

○本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈でんを生じることがあります。効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

〔効能〕

○滋養強壮 ○虚弱体质

○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 小林药品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地  
お客様相談室 電話:0120-584-419

# 肝臓 加水分解物配合 ビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>、タウリン



滋養強壮・  
肉体疲労時などの  
栄養補給に

ゴールドユニーLV液

第3類医薬品

〔成分・分量〕 50mL中

肝臓加水分解物 200mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 200mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン 20mg、ゴミシ流エキス0.3mL(ゴミシ300mgに相当)、ジオウ流エキス 0.5mL(ジオウ500mgに相当)、タウリン 1200mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg、ピリドキシン塩酸塩 10mg、ニコチン酸アミド 20mg(アルコール 0.3mL以下)

添加物: カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレン glycol、バニリン

○本剤に配合されているリボフラビン リン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931