

【用法・用量】 成人(15才以上)  
1回1瓶(30mL)を1日3回服用  
してください。○用法・用量を厳  
守してください。○小児には服用  
させないでください。

【成分・分量】 30mL中  
カンゾウエキス…300mg、ショ  
ウキョウ流エキス…0.33mL、麦  
門冬流エキス…0.1mL、ビロ  
キシシト酸塩…10mg、ニコチ  
ン酸アミド…10mg、パンテノ  
ール…10mg、タウリン…300mg  
(アルコール0.3mL以下)  
添加物:アルコール、白糖、クエン  
酸Na水和物、クエン酸水和物、  
安息香酸Na、パラベン、香料、ブ  
ロピリングリコール、パニリン、ミ  
ツロウ、トメントール

副作用報告徴収制度 ☎ 0120-149-931



サイン液S ノンカフェイン

かぜ などの発熱で

体がだるいとき、  
食欲のないときの

栄養補給・  
滋養強壮に

3種の  
生薬

【効能】

- 病中病後・発熱性消耗性疾患・  
肉体疲労・胃腸障害・栄養障害  
などの場合の栄養補給
- 滋養強壮 ○ 虚弱体質

第2類医薬品 30mL

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地  
お客様相談室 電話:0120-584-419

【使用上の注意】してはいけないこと(守らないと  
現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくな  
る) 長期連用しないこと

相談すること 1.次の方は服用前に医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けて  
いる人。(2)高齢者。(3)むくみのある人。(4)高血圧、  
心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.服用後、次の  
症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、  
直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:発疹  
/消化器:胃部不快感 まれに下記の重篤な症状  
が起こることがある。その場合は直ちに医師の診  
療を受けること。偽アルドステロン症、ミオパシー:  
手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加  
えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。  
3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、  
このような症状の持続又は増強が見られた場合には、  
服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談すること 下痢 4. 5~6日間服  
用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、  
この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に  
相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ  
さい。(2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

ガラス:瓶、金属:キャップ

使用  
期間  
製造  
番号