

【用法・用量】成人(15才以上)
1日1瓶(30mL)を1日3回服用
してください。○用法・用量を厳
守してください。○小児には服用
させないでください。

【成分・分量】30mL中
カンゾウエキス…300mg、ショ
ウキョウ流エキス…0.33mL、麦
門冬流エキス…0.1mL、ピリド
キシン塩酸塩…10mg、ニコチ
ン酸アミド…10mg、パンテノ
ール…10mg、タウリン…300mg
(アルコール0.3mL以下)
添加物:アルコール、白糖、クエン
酸Na水和物、クエン酸水和物、
安息香酸Na、パラベン、香料、ブ
ロピレングリコール、バニリン、ミ
ツロウ、ノメントール

第2類医薬品

かぜなどで**熱**が出て
体がだるいとき、
食欲がないときの

栄養補給・滋養強壮に

カンゾウエキス・ショウキョウ流エキス・麦門冬流エキス錠

【効能】

- 病中病後・発熱性消耗性疾患・
肉体疲労・胃腸障害・栄養障害
などの場合の栄養補給
- 滋養強壮 ○虚弱体質

新ビタクルゴールド液
30mL(朝・昼・夜服用)

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中橋1丁目139番地
お客様相談室 電話:0120-584-419

【使用上の注意】してはいけないこと(守らないと
現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくな
る)長期運用しないこと

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受け
ている人。(2)高齢者。(3)むくみのある人。(4)高血
圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.服用後、
次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
あるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:
発疹/消化器:胃部不快感 まれに下記の重篤な症
状が起こることがある。その場合は直ちに医師の
診療を受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー:
手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加
えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、
このような症状の持続又は増強が見られた場合に
は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること 下痢 4.5~6日
間服用しても症状がよくなる場合は服用を中
止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ
さい。(2)小児の手の届かない所に保管してくだ
さい。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

ガラス瓶
金属キャップ

使用
期限
製造
番号



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931