

【成分・分量】 30mL中  
カンゾウエキス…300mg、ショウキョウ流エキス…0.33mL、麦門冬流エキス…0.1mL、ピロキシン塩酸塩…10mg、ニコチン酸アミド…10mg、パンテノール…10mg、タウリン…300mg  
(アルコール0.3mL以下)

添加物:アルコール、白糖、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、パニリン、ミツロウ、パーメントール

【用法・用量】 成人(15才以上) 1回1瓶(30mL)を1日3回服用してください。○用法・用量を厳守してください。○小児には服用させないでください。

4



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

かぜなどで熱が出て  
体がだるい時、食欲のない時の  
栄養補給に

**ブルミン液s**

カンゾウエキス・ショウキョウ流エキス  
麦門冬流エキス 配合

【効能】

- 病中病後・発熱性消耗性疾患・  
肉体疲労・胃腸障害・栄養障害  
などの場合の栄養補給
- 滋養強壮 ○虚弱体質

第2類医薬品

30mL

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中須1丁目139番地  
本社所在地 東京都中央区日本橋蛸町140番6号  
お客様相談室 電話 058-278-3933

【使用上の注意】してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 長期連用しないこと

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)むくみのある人。(4)高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:発疹/消化器:胃部不快感、下痢 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

ガラス:瓶、金属:キャップ

使用期限

製造番号