

〔使用上の注意〕 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：発疹／消化器：胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1日1回
1瓶(100mL)を服用してください。

○用法・用量を厳守してください。

○小児には服用させないでください。

〔効能〕

○滋養強化 ○虚弱体质
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

ガラス：瓶

金属：キャップ

4 987336764119



滋養強化・肉体疲労時の栄養補給に

アミノ酸成分 4000 +生薬配合

タウリン3000mg

エムビタアミノゴールド

第2類医薬品

100mL

〔成分・分量〕 100mL中

L-パリシン60mg、L-ロイシン240mg、L-イソロイシン60mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物240mg、カルニチン塩化物100mg、タウリン3000mg、ローヤルゼリー100mg、淫羊藿流エキス0.1mL、山茱萸流エキス0.2mL、イノシトール100mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチニン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg(アルコール0.3mL以下)
添加物:カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、安息香酸ベンジル
○本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより尿が黄色くなることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

小林薬品工業株式会社
製造販売元
岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

お客様相談室 電話:0120-584-419
受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限
製造番号