

販売名:小児用ヒストミンゴールド液S

成分・分量 30mL中 カンゾウエキ  
S150mg、タウリン100mg、グルコン酸カル  
シウム水和物100mg、リボフラビン酸エ  
ステルナトリウム1mg、パンテノール3.3mg  
添加物:クエン酸Na水和物、クエン酸水和  
物、白糖、安息香酸Na、パラベン、アルコー  
ル、香料、グリセリン、パニコリン、ミツロウ、トメ  
ントール、エチルパニコリン

用法・用量 5才~14才1日1瓶(30mL)  
を1日3回服用してください。

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児  
に服用させる場合には、保護者の指導監督のも  
とに服用させてください。



ガラス:瓶、金属:キャップ

HapYcom

小児用  
30mL

栄養ドリンク

かぜの時などの  
栄養補給に

第2類医薬品



【効 能】

○ 幼小児の発育期・偏食児・発熱性消耗性疾  
患・病中病後・胃腸障害・栄養障害などの場合  
の栄養補給 ○ 虚弱体質 ○ 滋養強壮

製 造 小林薬品工業株式会社

販売元 岐阜県岐阜市中輪1丁目139番地

お客様相談室 電話:0120-584-419

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

使用上の注意 ○ 本剤は小児用ですが、定められた  
一般的な注意事項を記載しています。してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりや  
すくなる)長期連用しないこと 相談すること1.次の人は服  
用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)  
医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)むくみのある  
人。(4)高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.  
服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が  
あるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬  
剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:発疹/消化  
器:胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることが  
ある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。偽アル  
ドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つばり  
感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々  
に強くなる。3.服用後、次の症状があらわれることがある  
ので、このような症状の持続又は増強が見られた場合に  
は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談すること 下痢 4.5~6日間服用しても  
症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持  
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当  
たらぬ涼しい所に保管してください。(2)小  
児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤  
用の原因になったり品質が変わります。)

使用  
期限

製造  
番号