

販売名:ヒストミンゴールド液プラス

成分・分量 30mL中 カンゾウエキス
300mg、ショウキョウ流エキス0.33mL、トフヒ流
エキス0.17mL、麦門冬流エキス0.1mL、サイコエキ
ス30mg、ケイヒ流エキス0.1mL、ピリドキシン塩
酸塩10mg、ニコチン酸アミド10mg、パンテノール
10mg、タウリン300mg(アルコール0.3mL以下)
添加物アルコール、白糖、クエン酸Na水和物、ク
エン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、グリ
セリン、パニリン、ミツロウ、メントール

用法・用量 成人(15才以上)1回1瓶
(30mL)を1日3回服用してください。
○用法・用量を厳守してください。
○小児には服用させないでください。



ガラス:瓶、金属:キャップ

HapYcom

栄養ドリンク

熱によるだるさ
疲労、胃腸障害

30mL 第2類医薬品

効能

○病中病後・発熱性消耗性疾患・肉体疲労・胃
腸障害・栄養障害などの場合の栄養補給○滋
養強壮○虚弱体質

製造 小林薬品工業株式会社
販売元

岐阜県岐阜市中錦1丁目139番地
お客様相談室 電話:0120-584-419

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

使用上の注意 してはいけないこと(守らないと現
在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと 相談すること 1.次の人は服用
前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)
医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)むくみの
ある人。(4)高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能
性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持っ
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:
発疹/消化器:胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が
起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を
受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー:手足
のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、
脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.服用
後、次の症状があらわれることがあるので、このよう
な症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を
中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談すること 下痢 4.5~6日間服用しても症状
がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持っ
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たら
ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届
かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替
えないでください(誤用の原因になったり品質が変
わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用し
ないでください。

使用
期限

製造
番号