

成分・分量 30mL中 カンゾウエキス 300mg、紅参乾燥エキス25mg、麦門冬流エキス0.1mL、ショウキョウ流エキス0.1mL、トウヒ流エキス0.17mL、ケイヒ流エキス0.1mL、ピロドキシリン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド10mg、パンテノール10mg、タウリン300mg (アルコール0.3mL以下)

添加物:アルコール、白糖、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン、バニリン、ミツロウ、トメントール

用法・用量 成人(15才以上)1回1瓶(30mL)を1日3回服用してください。

○用法・用量を厳守してください。

○小児には服用させないでください。

ガラス瓶、金属キャップ



かぜなどで**熱**が出て

体がだるい時

食欲のない時の

栄養補給に

ブルミン液v

〔効能〕

- 病中病後・発熱性消耗性疾患・肉体疲労・胃腸障害・栄養障害などの場合の栄養補給
- 滋養強壮○虚弱体質

第2類医薬品 30mL

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**

岐阜県岐阜市中鎮1丁目139番地

お客様相談室 電話 0120-584-419

使用上の注意 してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)長期連用しないこと **相談すること** 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)むくみのある人。(4)高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:発疹/消化器:胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばわりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用
期限

製造
番号