

【使用上の注意】 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢

3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【用法・用量】

成人(15才以上)1日1回
1瓶(100mL)を服用してください。

○用法・用量を厳守してください。

○小児には服用させないでください。

【効 能】

○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・
妊娠授乳期などの場合
の栄養補給

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

ガラス：瓶

金属：キャップ



第2類医薬品

100mL

アミノ酸成分
5300

Amino.
Hol-mny.



ホルユニーアミノ5300

【成分・分量】100mL中

L-バリン60mg、L-ロイシン240mg、L-イソロイシン60mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、L-リジン塩酸塩210mg、グリシン310mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物1000mg、タウリン3000mg、インヨウカク流エキス0.1mL、サンシュユ流エキス0.2mL、カルニチン塩化物120mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg (アルコール0.3mL以下)

添加物：カラメル、白糖、D-ソルビトール、スクラロース、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、グリセリン、プロピレングリコール
○本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより尿が黄色くなる場合があります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

お客様相談室 電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

使用
期限
製造
番号

