

販売名:ヒストミンゴールド液

成分・分量 30mL中 カンゾウエキス  
300mg、ショウキョウ流エキス0.33mL、麦門冬流  
エキス0.1mL、トウヒ流エキス0.17mL、サイコエキス  
30mg、ケイヒ流エキス0.1mL、黄耆流エキス0.1mL、  
ピロキシシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド10mg、パ  
ンテール10mg、タウリン300mg(アルコール0.3mL  
以下)添加物:白糖、クエン酸Na水和物、クエン酸水和  
物、安息香酸Na、パラベン、カラメル、アルコール、香  
料、グリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール

用法・用量 成人(15才以上)1回1瓶  
(30mL)を1日3回服用してください。  
○用法・用量を厳守してください。  
○小児には服用させないでください。



ガラス瓶、金属キャップ

Hapycom

30mL

# 栄養ドリンク

## かぜの時などの 栄養補給に

### 第2類医薬品

【効能】

- 病中病後・発熱性消耗性疾患・肉体疲労・  
胃腸障害・栄養障害などの場合の栄養補給
- 滋養強壮 ○ 虚弱体質

製造 小林薬品工業株式会社  
販売元 岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

お客様相談室 電話:0120-584-419

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

使用上の注意 **してはいけないこと**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)長期連用しないこと **相談すること** 1.次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)むくみのある人。(4)高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:発疹/消化器:胃部不快感まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

使用  
期限

製造  
番号