

〔保管及び取扱い上の注意〕
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

熱が出てだるい 体が疲れて栄養補給に いる時の

ヒストミン[®] 内服液

DX

5種類の生薬+

紅参乾燥エキス配合

第2類医薬品

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鞆1丁目139番地
お客様相談室 電話：0120-584-419
副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

販売名：ヒストミン内服液DX

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1回1瓶(30mL)を1日3回服用してください。○用法・用量を厳守してください。○小児には服用させないでください。○生薬成分の配合により、まれに沈澱を生じることがありますが、効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

〔効能〕

○ 病中病後・発熱性消耗性疾患・肉体疲労・胃腸障害・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ○ 滋養強壮 ○ 虚弱体質

〔成分・分量〕 30mL中

紅参乾燥エキス50mg、生姜流エキス0.3mL、麦門冬流エキス0.1mL、
橙皮流エキス0.167mL、五味子流エキス0.1mL、淫羊藿流エキス
0.15mL、チアミン硝酸塩8mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸
アミド10mg、タウリン400mg、カルニチン塩化物30mg(アルコール
0.3mL以下)

添加物：カラメル、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸Na、
パラベン、アルコール、香料、ミツロウ、エチルバニリン、グリセリン、バニ
リン

〔使用上の注意〕 **相談すること**

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること