

服用に際しては、説明文書をよくお読みください

第2類医薬品

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】ドルチェルEX

△使用上の注意

相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、下痢

- 2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

←開封口

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。
*15歳未満は服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

紙 ガラス:瓶
金 属:キャップ K2

NEW
TASTE

滋養強壮

ドルチェル

EX

ママシ

ニンジン

インヨウカク



50mL

第2類医薬品

【成分・分量】成人1日量(50mL)中
ママシ抽出液(原生薬換算:100mg)…0.5mL
ニンジン流エキス(原生薬換算:600mg)…0.6mL
ジャコウ流エキス(原生薬換算:200mg)…0.2mL
ニクジュウ流エキス(原生薬換算:300mg)…0.3mL
インヨウカク流エキス(原生薬換算:300mg)…0.3mL
ローヤルゼリーチンキ(粉末原生薬換算:40mg)…100mg
タウリン…1000mg
チアミン硝化物(ビタミンB1硝化物)…10mg
リボフラビン(ビタミンB2)…3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)…5mg
ニコチン酸アミド…25mg
無水カフェイン…50mg

添加物:白糖、ハチミツ、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、パニリン(アルコール0.8mL以下)

<成分・分量に関連する注意>

- (1)本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色くなることがありますが、心配ありません。
- (2)本剤に配合されている生薬成分により、湿濁又は沈殿を生じることがありますので、よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

お客様相談室

電話 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

第2類医薬品

ドルチェル

EX

NEW
TASTE

滋養強壮

ドルチェル

EX

ママシ

ニンジン

インヨウカク



50mL

第2類医薬品



製造番号

使用期限