

スズレックスDX内服液Ⅱ (ビタミン含有保健薬)

第3類医薬品

成分・分量 1本(30mL)中

カンゾウ流エキス200 μ L(原生薬換算量200mg)、ケイヒエキス9mg(原生薬換算量200mg)、シクヤクエキス15mg(原生薬換算量60mg)、ショウキョウ流エキス400 μ L(原生薬換算量400mg)、タイソウ流エキス400 μ L(原生薬換算量400mg)、リボフラビン2.5mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、タウリン500mg、アルコール0.33mL以下
添加物:安息香酸Na、クエン酸Na、D-ソルビトール、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DL-アラニン、カラメル、還元麦芽糖水アメ、酒石酸、白糖、DL-リンゴ酸、香料

<成分・分量に関連する注意>本剤の服用により尿が黄色になることがあります。リボフラビン(ビタミンB₂)によるもので心配ありません。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1回1本(30mL)を1日2回を限度として服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。**<用法・用量に関連する注意>**(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児(15歳未満)には服用させないでください。



使用上の注意



相談すること

しばらく服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)4.本品は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響がありません。よく振ってから服用してください。5.封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。6.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

ホーユー株式会社 お客様相談室
電話:(052)935-9941
受付時間:土・日・祝日及び弊社休業日を除く午前9時~午後5時

発売元

hoyu ホーユー株式会社
名古屋市東区徳川一丁目501

製造販売元

ジェーピーエス製薬株式会社
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1