

# シナビック

(ビタミン含有保健薬)

## 第3類医薬品

### ⚠【使用上の注意】



#### ■ 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人（15才以上）1回1本（30mL）を1日2回を限度として服用してください。  
ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

### 【成分・分量】 1本（30mL）中

リボフラビン 2.5mg、ピリドキシン塩酸塩 10mg、ニコチン酸アミド 20mg、タウリン 500mg、カンゾウ流エキス 200 $\mu$ L（原生薬換算量200mg）、ケイヒエキス 9mg（原生薬換算量200mg）、シヤクヤクエキス 15mg（原生薬換算量60mg）、ショウキョウ流エキス 400 $\mu$ L（原生薬換算量400mg）、タイソウ流エキス 400 $\mu$ L（原生薬換算量400mg）  
（アルコール0.33mL以下）

添加物：酒石酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、安息香酸Na、DL-アラニン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、カラメル、パラベン、香料

#### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 本品は生薬成分を含むため、沈殿することがありますが、薬効には支障がありません。よく振ってから服用してください。
- (5) 封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 電話 045-593-2136

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）