

●使用上の注意 / 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹等

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

●効能・効果/滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

●用法・用量/成人(15歳以上)

1回1本、1日1回服用する。

○用法・用量を厳守すること。

●成分・分量(50mL中)/ロクジョウチンキ0.1mL(ロクジョウとして28.6mg) オキソアミジン40.0mg チアミン硝酸物10.0mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム5.0mg ビリドキシン塩酸塩10.0mg ニコチン酸アミド25.0mg 無水カフェイン50.0mg (添加物)白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、バニリン

○リボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

Kowa

強壮生薬エキス配合
ドリンク剤



ミオD_{コープ}
50α

第3類医薬品

●保管及び取扱い上の注意 / (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

(2)小児の手の届かない所に保管すること。

(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造 滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879



ビタミン含有保健薬

お問い合わせ先 興和(株) お客様相談センター
TEL 03-3279-7755 月~金(祝日を除く) 9:00~17:00

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

R2S