

肝臓 加水分解物

600mg配合

滋養強壮・栄養補給

レバグッド®

30mL×3本

第3類医薬品

肝臓 加水分解物

滋養強壮・栄養補給

レバグッド®

8種類の
有効成分
配合

ビタミンB₂・B₆

L-バリン

L-ロイシン

L-イソロイシン

タウリン

ゴミシエキス

600mg配合



30mL×3本

第3類医薬品



第3類医薬品

レバグッド®

30mL×3本

服用前にこの説明書きを必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

【使用上の注意】

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【成分分量】1本(30mL)中
 肝臓加水分解物600mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)12mg、ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)6mg、タウリン1000mg、L-イソロイシン80mg、L-バリン80mg、L-ロイシン160mg、ゴミシエキス53.6mg
 添加物としてエリスリトール、スクラロース、カラメル、クエン酸、安息香酸Na、バラベン、香料、エタノール、エチルパニリン、グリセリン、パニリン、プロピレングリコールを含有します。

<成分分量に関連する注意>
 配合成分のリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

【効能効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法用量】

成人(15才以上)1回1本、1日1回服用して下さい。

<用法用量に関連する注意>
 用法用量を厳守して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 表示の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先
 滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
 電話：(0748)88-3180(大代表)
 受付時間：9時から17時まで(土、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元
 **滋賀県製薬株式会社**
 滋賀県甲賀市甲賀町蒲879

(R)登録商標



使用期限

製造番号



1A5