

発熱性消耗性疾患  
病中病後の栄養補給に



4 974042 300373

ハイスミン®  
ジュニア

小・中学生用  
(7才～15才未満)

第3類医薬品



発熱性消耗性疾患  
病中病後の栄養補給に

ハイスミン®  
ジュニア 小・中学生用  
(7才～15才未満)

発熱性消耗性疾患  
病中病後の栄養補給に

ハイスミン®  
ジュニア 小・中学生用  
(7才～15才未満)

30mL×3本入

第3類医薬品



30mL×3本入

第3類医薬品



使用期限

製造番号





## 第3類医薬品 **ハイスミン<sup>®</sup>ジュニア** 30mL×3本入

服用前にこの説明書きを必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

### 【使用上の注意】

#### ■ 相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

- しばらく服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

#### 【成分分量】 1本(30mL)中

リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>) 2.5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) 5mg、ニコチン酸アミド 10mg、タウリン375mg、カルニチン塩化物50mg、グルコン酸カルシウム水和物 140mg、カンゾウエキス50mg、ケイヒ流エキス0.05mL、タイソウエキス50mg、ニンジン乾燥エキス14mg、ローヤルゼリーチンキ50mg、バクモンドウエキス200mg 添加物として白糖、D-ソルビトール、エリスリトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、バラベン、香料、パニリン、プロピレングリコールを含有します。(アルコール0.12mL以下)

#### 【効能効果】

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・偏食児・小児の発育期等の場合の栄養補給

#### 【用法用量】

7才以上15才未満1回1本、1日2回服用して下さい。  
●用法用量を厳守して下さい。  
●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 表示の期限内に服用して下さい。  
●配合成分により、まれに沈殿を生じることがあります。よく振って服用して下さい。●配合成分のリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

#### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電話：(0748)88-3180(大代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

**滋賀県製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町海879

(R)登録商標

**サンドラッググループ**