

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品



ゼリア新薬

胃腸障害時の栄養補給, 滋養強壮に

ヘパリーゼ<sup>®</sup>α

肝臓水解物・L-システイン・ビタミンC配合 (滋養強壮保健剤)



## 〔特 徴〕

- \*ヘパリーゼαは、天然の良質なレバーを消化吸収しやすいように分解した「肝臓水解物」を主成分として配合した医薬品です。
- \*お付き合いや残業の機会が多く疲れを感じた時や、胃腸の調子が良くない時などの栄養補給, 滋養強壮に効果を発揮します。
- \*肝臓水解物とともに代謝酵素の活性を高めるL-システイン, ビタミンC(アスコルビン酸)などが新陳代謝を促します。
- \*赤褐色の糖衣錠です。



## 使用上の注意

### 相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

3. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

滋養強壮, 胃腸障害・栄養障害・病中病後・肉体疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給, 虚弱体質

## 〔用法・用量〕

次の1回量を1日2回服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	2回
15才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)食前・食後, いずれの服用でもかまいません。

(必ず裏面もお読みください)

## 〔成分〕1日量(6錠)中

成分	分量	はたらき
肝臓水解物	600mg	天然の良質なレバーを消化吸収しやすいように分解したものです。 肝臓の新陳代謝を活発にする事により、滋養強壮効果を発揮します。
L-システイン	160mg	アミノ酸の1種で代謝酵素の活性を高め、新陳代謝を促します。
ビタミンC (アスコルビン酸)	300mg	抗酸化作用によりL-システインなどの働きをサポートします。
ビタミンB <sub>2</sub> (リボフラビン)	12mg	全身の新陳代謝に欠かせないビタミンです。
インチンコウ末	75mg	弱った胃腸をサポートし、滋養強壮効果を発揮する生薬成分です。


添加物：クロスカルメロースナトリウム、ケイ酸カルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、アラビアゴム末、精製白糖、ヒプロメロース、硫酸カルシウム、プルラン、酸化チタン、三二酸化鉄、赤色三号、青色一号、カルナウバロウ

### 〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがあります。尿及び大便の検査を受ける場合には、本剤(ビタミンCを含有する製剤)を服用していることを医師にお知らせください。
- (2)本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは成分のビタミンB<sub>2</sub>によるものですので、ご心配ありません。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)高温となる場所には保管しないでください。  
(錠剤の亀裂や変色の原因となります。)
- (3)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (5)瓶の中に乾燥剤が入れてありますので、本剤を使い終わるまでは捨てないでください。  
また、間違えて服用しないように注意してください。
- (6)瓶の中の詰め物を捨てたのちは、落下等の衝撃で錠剤破損(糖衣の欠け)が生じることがありますので、取扱いには注意してください。なお、開封時等に成分の特有なにおいを感じる場合があります。
- (7)本剤は糖衣錠ですので、水分が錠剤につくと、表面の糖衣が一部とけて、変色又はむらが生じることがありますから、ぬれた手で取扱わないようにしてください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (9)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。



高温で保管しないこと

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11  
受付時間 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

へパリーゼはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元  
**ゼリア新薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町10-11