

第3類医薬品

販売名:へパリーゼ コンクレバン



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
1歳未満の乳児。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分分量

30mL中

成分	分量
肝臓加水分解物	600mg
心臓エキス	300mg
チアミンジスルフィド(ビタミンB ₁)	13.5mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	3mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	30µg

添加物:クエン酸水和物、パラベン、プロピレングリコール、pH調節剤2成分、香料、ハチミツ、白糖、ブドウ糖、カラメル

〈成分分量に関連する注意〉尿を黄変させることがある。

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 03-3527-3690

受付時間:9:00~17:50(土・日・祝日を除く)



ゼリア新薬

滋養強壮

へパリーゼ

コンクレバン

肝臓加水分解物 ビタミンB₁・2・6・12 心臓エキス配合



効能・効果

- 滋養強壮。
- 虚弱体質。
- 肉体疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

用法・用量

通常1日量30mLを2~3回に分けて随時服用する。

〈用法・用量に関連する注意〉
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

500mL



第3類医薬品

開栓時に記入してください。

開栓年月日

品質保持の点から、開栓後速やかに服用すること。

開栓後要冷蔵

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 開栓後はフタをしっかりとしめ、冷蔵庫に立てて保管すること。
- (5) 雑菌などの汚染の恐れがあるので、ピンの口に直接口をつけて服用したり、目盛り付きコップに入れたものをビンに戻さないこと。
- (6) 服用途中、味・においなどに変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。
- (7) ピンの口、目盛り付きコップは清潔に保つこと。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

へパリーゼはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

製造番号 使用期限(年・月)



キャップ:PP・中栓:PP

フィルム:PET・目盛り付きコップ:PS

ガラス:ピン

125