

本品には添付文書はありませんので、  
ラベルの画像を掲載します。

4987305322463





**リコリス<sup>「ゼンヤク」</sup>エース**  
第2類医薬品  
20mL  
〔効能・効果〕  
病中病後・胃腸障害・発熱性消耗性疾患・  
肉体疲労・妊娠授乳期・栄養障害などの場  
合の栄養補給、虚弱体質、滋養強壮

副作用被害救済制度  
電話：0120-149-931

12-F

製造販売元 **全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15  
全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

販売名：リコリス「ゼンヤク」エース

**使用上の注意**  
してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。) 長期連用しないこと。

**相談すること** 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ (4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。●偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**(用法・用量)** 成人(15才以上) 1回1びん(20mL)を1日3回服用してください。

\*小児(15才未満)は服用しないこと。

**(成分)** (1びん20mL中) カンゾウ(甘草)エキス333mg(原生薬換算量1,667mg)、サイコエキス33mg、タイソウエキス133mg、ゴミシエキス35.7mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg

添加物としてアルコール、クエン酸Na、炭酸水素Na、パラベン、エリソルビン酸Na、還元麦芽糖水アメ、チンピチンキ、白糖、水アメを含有します。

**保管及び取扱上の注意**  
(1)直射日光のあたらない涼しい所に保管すること。  
(2)小児の手のとどかない所に保管すること。  
(3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。  
(4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意すること。

**使用期限(年月)**  
**製造番号**