

[保管及び取扱い上の注意]

1.直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。2.小児の手のとどかない所に保管してください。3.使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。4.キャップの切り口で手指等を切らないようご注意ください。

●本剤は、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムを多く配合していますので、わずかに混濁、沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。 4-1

発売元 全薬工業株式会社  
営業所 東京都文京区大塚5-6-15  
全薬工業お客様相談室 TEL.03(3946)3610  
製造販売元 日野薬品工業株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931



手やひざの関節の痛み

肩こり、目の疲れに

モア-ロング®



コンドロイチン<sup>硫酸</sup>  
450<sup>エステルナトリウム</sup>mg

ビタミン  
B<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub> 使用期限(年月)

服用しやすい

りんご風味

製造番号

第3類医薬品

50mL

【成分】(1びん50mL中)

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム450mg、チアミン硝酸化物(ビタミンB<sub>1</sub>)10mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>)7.5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)25mg、ニコチン酸アミド30mg添加物として安息香酸Na、エタノール、クエン酸、D-ソルビトール、パラベン、香料、還元麦芽糖水アメ、白糖、dl-リンゴ酸を含有します。

●本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤中のリポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですので、ご心配ありません。

【使用上の注意】

【相談すること】

1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

①次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労。②脚気。

「ただし、①、②の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

③次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時。

【用法・用量】

15才以上1回1びん(50mL)を1日1~2回服用してください。

2回の場合は、服用間隔を4時間以上おいてください。

※15才未満は服用しないでください。