

本品には添付文書はありませんので、ラベルの画像を掲載します。

第2類医薬品

30mL

【効能・効果】  
肉体的疲労・集中力低下・神経性精神性障害・  
胃腸障害・栄養障害・妊娠授乳期などの場合  
の栄養補給、滋養強壮、虚弱改善

全薬  
製造販売元  
全薬工業株式会社  
東京都文京区大塚5-8-15  
全薬工業株式会社TEL:03(3346)3800

副作用等懸念抑制薬  
電話:0120-149-631

体がだるい時の  
栄養補給、  
滋養強壮に。

DX

使用上の注意

販売名：リコリス「ゼンヤク」DX

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）長期連用しないこと。

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。●偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(用法・用量)成人(15才以上)1回1びん(30mL)を1日3回服用してください。

\*小児(15才未満)は服用しないこと。

(成分)(1びん30mL中)カンゾウ(甘草)エキス333mg(原生薬換算量1,667mg)、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、パンテノール20mg、タウリン300mg、タイソウ(大棗)エキス133mg

添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、香料、L-アスパラギン酸Na、アセスルファムK、エリソルビン酸Na、塩化Na、カラメル、還元麦芽糖水アム、ステビア抽出物、チンピチンキ、トレハロースを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光のあたらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。(4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意すること。

使用期限  
(年、月)

製造番号