

本品には添付文書はありませんので、ラベルの画像を掲載します。

4987305323125





〔効能・効果〕 20mL  
発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・  
胃腸障害・妊娠授乳期・栄養障害などの場  
合の栄養補給、虚弱体質、滋養強壮

**第2類医薬品**

製造販売元 **全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15  
全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

9-F

**使用上の注意** 販売名:リコリス「ゼンヤク」α  
してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)長期連用しないこと。  
相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。  
●偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(用法・用量)成人(15才以上)1回1びん(20mL)を1日3回服用してください。  
\*小児(15才未満)は服用しないこと。  
(成分)(1びん20mL中)カンゾウ(甘草)エキス300mg(原生薬換算量1,500mg)、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、パンテノール20mg、タウリン300mg、ショウキョウエキス10mg 添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、カラメル、チンピチンキ、白糖を含有します。

**保管及び取扱い上の注意**  
(1)直射日光のあたらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。(4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意すること。

**使用期限**  
(年、月)

**製造番号**