

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



発熱性消耗性疾患・
病中病後などの栄養補給

ゼナ ノンカフェ

第2類医薬品

ゼナ ノンカフェ

(ビタミン含有保健薬)

- ◆ゼナ ノンカフェは、かぜなどの発熱性消耗性疾患や、病中病後などの栄養補給にたいへん効果的なミニドリンク剤です。
- ◆カンゾウ ケイヒ タイソウ甘草、桂皮、大棗や、ブラジル原産の強壯生薬 ムイラブアマをはじめ、計14種の生薬(原生薬として計4320mg相当)とタウリン、ビタミンを配合。
- ◆カフェインを配合していません。



使用上の注意



相談すること

- 1 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

- 2 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

- 3 しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください


効能

☆発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・食欲不振・栄養障害・
妊娠授乳期などの場合の栄養補給

☆滋養強壯

☆虚弱体質

こんな時に



かぜなどの発熱で体力を消耗している時の栄養補給に



病中病後の栄養補給に



滋養強壯に

用法・用量

次の量を服用してください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1本 (50mL) 	1日1回
15才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

成分

1本(50mL)中

カンゾウ(甘草)エキス 37.5mg (甘草150mgに相当)	ニンジン(人參)エキスM 90mg (人參600mgに相当)
ショウキョウ(生姜)チンキ 0.6mL (生姜120mgに相当)	ムイラブアマエキス-A 15mg (ムイラブアマ300mgに相当)
ケイヒ(桂皮)流エキス 0.3mL (桂皮300mgに相当)	ハンピ(反鼻)チンキ 1.25mL (反鼻250mgに相当)
タイソウ(大棗)軟エキス 70mg (大棗230mgに相当)	ブクリョウ(茯苓)エキス-A 9.6mg (茯苓300mgに相当)
シャクヤク(芍薬)エキス 30mg (芍薬120mgに相当)	ロクジョウ(鹿茸)チンキ 1.08mL (鹿茸300mgに相当)
ジオウ(地黄)エキス-A 150mg (地黄300mgに相当)	イカリ草(淫羊藿)エキス 100mg (淫羊藿1000mgに相当)
トウキ(当帰)流エキス 0.05mL (当帰50mgに相当)	タウリン 500mg
オウギ(黄耆)流エキス 0.3mL (黄耆300mgに相当)	リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg (ビタミンB ₂)
	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) 5mg

添加物：白糖、パラベン、安息香酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポピドン、クエン酸、クエン酸Na、香料、アルコール

(アルコール1.45mL以下)

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号



<http://www.taisho.co.jp/zena/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)