

使用上の注意【相談すること】

次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)服用後、次の症状があらわれた場合。皮膚：発疹、消化器：胃部不快感(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。

成分・分量 本品1日量(30mL)中

リボフラビンリン酸エステルナトリウム	2mg
ピリドキシン塩酸塩	5mg
カルニチン塩化物	100mg
ニコチン酸アミド	20mg
無水カフェイン	50mg
タウリン	500mg
ロクジョウチンキ	20μL
ローヤルゼリーチンキ	50mg
インヨウカク流エキス	50μL
ゴウチンキ	100μL

[アルコール0.3mL以下]

添加物：ハチミツ、果糖ブドウ糖液糖、白糖、DL-リンゴ酸、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、エタノール、カラメル、香料、グリセリン

本品は、生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に影響はありません。よく振ってから服用して下さい。

製造年月日(ロットNo.)

滋養強壮、虚弱体質

クロンミン ローヤルα

第2類医薬品

牛黄 鹿茸

発売元 株式会社 **三 皮**

大阪府東大阪市本庄2丁目6番21号
お客様相談室 ☎0800-100-5599

効能

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1瓶(30mL)を服用する。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること(2)小児の手のとどかない所に保管すること(3)誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

販売名：クロンミンローヤルα

第2類医薬品

30mL A17JG。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造販売元

大同薬品工業株式会社
奈良県葛城市新村214番地1

使用期限

