

服用に際して、瓶の表示を必ず読むこと
使用上の注意

【相談すること】

次の場合は、直ちに服用を中止し、この
瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場
合。皮膚：発疹、消化器：胃部不快感
(2) しばらく服用しても症状がよくな
らない場合。

成分・分量

【成分】1瓶(30mL)中

リボフラビンリン酸エステルナトリウム…… 3mg
ピリドキシン塩酸塩 …………… 10mg
ニコチン酸アミド …………… 30mg
カルニチン塩化物 …………… 100mg
タウリン …………… 1000mg
無水カフェイン …………… 50mg
イノシトール …………… 50mg
ニンジンエキス …………… 90mg
ゴオウチンキ …………… 100μL
ロクジョウチンキ …………… 10μL

[アルコール0.7mL以下]

添加物：白糖、果糖ブドウ糖液糖、D-ソ
ルビトール液、DL-リンゴ酸、L-グルタミ
ン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、パ
ラオキシ安息香酸ブチル、エタノール、
カラメル、香料、グリセリン、バニリン、
エチルバニリン、プロピレングリコール
・本品は、生薬成分を含むため、まれに
沈殿を生じることがありますが、服用に
支障はありません。

製造年月日(ロットNo.)

発熱性消耗性疾患時の栄養補給

滋養強壯
虚弱体質

第3類医薬品

人參 牛黃

ロクジョウ 30mL

クロンミン
内服液Ⅱ

発売元

第一薬品浦田営業所
富山市水橋町720番地

効能又は効果

【効能】滋養強壯、虚弱体質、肉体
疲労・病中病後・食欲不振・栄養障
害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳
期などの場合の栄養補給

用法・用量

【用法・用量】成人(15歳以上)
1日1回1瓶(30mL)を服用する。
(1) 用法・用量を守ること。(他の
ビタミン等を含む製品を同時
に使用する場合には過剰摂取等に
注意すること)(2) よく振ってから
服用すること。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい
所に保管すること(2) 小児の手の
とどかない所に保管すること(3)
誤用を避け、品質を保持するた
めに、他の容器に入れかえないこと
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用
しないこと

販売名：クロンミン内服液Ⅱ

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 B20ISo

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1

使用期限