

発熱性消耗性疾患時の栄養補給

服用に際して、瓶の表示を必ず読むこと
使用上の注意

【相談すること】
次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。皮膚：発疹、消化器：胃部不快感
- (2) しばらく服用しても症状がよくなりません。

成分・分量

【成分】1瓶(30mL)中
 リポアピニン酸エステルナトリウム……… 3mg
 ビリドキシン塩酸塩 …………… 10mg
 ニコチン酸アミド …………… 30mg
 カルニチン塩化物 …………… 100mg
 タウリン …………… 1000mg
 無水カフェイン …………… 50mg
 イノシトール …………… 50mg
 エンジンエキス …………… 90mg
 ゴオウチンキ …………… 100μL
 ロクジョウチンキ …………… 10μL

【アルコール0.7mL以下】
 添加物：白糖、果糖ブドウ糖液糖、D-ソルビトール液、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、エタノール、カラメル、香料、グリセリン、バニリン、エチルバニリン、プロピレングリコール
 ・本品は、生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、服用に支障はありません。

製造年月日(ロットNo.)

滋養強壯 虚弱体質

第3類医薬品

人参 牛黄

ロクジョウ 30mL

クロンミン

内服液II

¥450+税

発売元

株式会社 山田漢方

大阪府羽曳野市高鷲7丁目80-2

効能又は効果

【効能】滋養強壯、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

【用法・用量】成人(15歳以上)
 1日1回1瓶(30mL)を服用する。
 (1) 用法・用量を守ること。(他のビタミン等を含む製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)(2) よく振ってから服用すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること
- (3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと
- (4) 使用期限を過ぎた製剤は服用しないこと

販売名:クロンミン内服液II

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 A18IS

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1

使用期限