

服用に際して、パッケージ又はラベルの説明文をよくお読みください。

滋養強壯剤

第2類医薬品

チオビタ[®]ゴールド

TIOVITA GOLD

【使用上の注意】

相談すること

1. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

- 発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給
- 滋養強壯
- 虚弱体質

【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1本（30mL）を服用して下さい。

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

【成分（1本30mL中）】

ローヤルゼリー 100mg、
ニンジン流エキス 0.6mL（原生薬600mgに相当）、
インヨウカク流エキス 0.1mL（原生薬100mgに相当）、
チアミン硝化物（ビタミンB₁） 5mg、
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂） 5mg、
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆） 5mg、
ニコチン酸アミド 30mg、
無水カフェイン 50mg（アルコール0.2mL以下）
添加物：果糖、クエン酸、没食子酸プロピル、アルコール、
安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、トウモロコシデンプン、香料

- （1）生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。
- （2）本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包 装

- 1箱3本（30mL×3本）入り
- 1箱10本（30mL×10本）入り

●上記の内容はパッケージ又はラベルに表示しております。

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

TEL0120-149-931（フリーダイヤル）



製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<https://www.taiho.co.jp/>

®：登録商標

販売名：チオビタゴールド



使用上の注意


相談すること 1.服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

■発熱性消耗性疾患・
肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・
産前産後などの場合の
栄養補給 ■滋養強壮
■虚弱体質

用法・用量

成人(15歳以上)は、
1日1回1本(30mL)
を服用して下さい。
●小児(15歳未満)は
服用しないで下さい。
●用法・用量を守って
下さい。



製造販売元

大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>



滋養強壮・虚弱体質・栄養補給に

チオビタ
ゴールド

TIOVITA
GOLD

第2類医薬品

30mL

成分 — 1本(30mL)中 —

ローヤルゼリー 100mg、ニンジン流エキス 0.6mL
(原生薬 600mgに相当)、インヨウカク流エキス
0.1mL (原生薬 100mgに相当)、チアミン硝酸物
(ビタミンB₁) 5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリ
ウム(ビタミンB₂) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン
B₆) 5mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg
(アルコール 0.2mL以下) 添加物：果糖、クエン酸、
没食子酸プロピル、アルコール、安息香酸Na、pH
調整剤、バニリン、トウモロコシデンプン、香料
(1)生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあ
るので、よく振ってから服用して下さい。
(2)本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が
黄色になることがあります。心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓
後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい
(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用
期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

ガラス：瓶

金属：キャップ

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

®：登録商標

使用
期限

製造
番号
L1905