

第3類医薬品

〔使用上の注意〕

相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること/皮膚：発疹/消化器：胃部不快感、下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔成分・分量〕 1日量1本 (50mL) 中
チアミン硝化物 (ビタミンB1) ……10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2) ……5mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6) ……20mg
ニコチン酸アミド ……30mg
無水カフェイン ……50mg
タウリン ……800mg
ニンジンエキス (ニンジン610mgに相当) ……55mg
ゴオウ抽出液 (ゴオウ2mgに相当) ……100µL
クラテグス乾燥エキス (クラテグス300mgに相当) 30mg
添加物：白糖、ハチミツ、D-ソルビトール、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、カラメル、エドト酸Ca/2Na、エタノール、香料、グリセリン、バニリン、プロピレングリコール〔アルコール0.2mL以下〕
●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931
〈お客様相談室〉 06-6203-5151
受付時間10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 TL06

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

ニンジン・ゴオウ

クラテグス乾燥エキス

ビタミンB1・B2・B6、タウリン

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

リキゴール

A&A

リキゴールA&A

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上) 1日1回1本(50mL)を服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。
- 本剤は、まれに沈殿を生じることがあります。よく振って服用すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

使用期限

製造番号